

# 病虫情报

第十四期

华容县植保植检站

2025年8月13日

## 及时抓好棉花、蔬菜、大豆病虫防治

据我站8月6日-9日在新河、插旗、章华、禹山、操军等地蔬菜、棉花、大豆田间调查，相关病虫害已进入发生为害盛期，甜菜夜蛾8月8日-9日已进入羽化高峰，预测5日后进入为害高峰。

请各乡镇迅速通知农户抓好棉花、蔬菜、大豆当前病虫防治工作。

### 一、防治时间：8月14-16日

### 二、防治对象：

棉花：主治甜菜夜蛾、棉盲蝽蟓、红铃虫、红蜘蛛、蚜虫等。

蔬菜：根据不同品种选择相关防治对象，瓜果类主治甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、实蝇、瓜绢螟、蚜虫；叶菜类主治甜菜夜蛾、斜纹夜蛾；豆科类主要防治豆野螟、豆荚螟、盲蝽蟓、茄科类主要防治烟青虫、棉铃虫等。

大豆：虫害防治斜纹夜蛾，盲蝽蟓，红蜘蛛，豆荚螟，食心虫，病害防治锈病、茎枯病、炭疽病、霜霉病、细菌性斑点病、菌核病等。

### 三、防治药剂：

**甜菜夜蛾、烟青虫：**采用茚虫威、虫螨腈或与甲维盐的复配剂、苏云金杆菌等喷雾防治。

**斜纹夜蛾、棉铃虫、棉大卷叶螟：**采用氟铃脲或甲维盐或氯虫苯甲酰胺或金龟子绿僵菌等喷雾防治。

**盲蝽蟓：**采用 17% 马拉硫磷、40% 丙溴磷 1000-1500 倍液或 20% 啶虫脒 10 克每亩等农药喷雾防治。

**红铃虫：**每亩采用 2.5% 高效氯氟氰菊酯乳油 30ml 或 2.5% 溴氢菊脂 45ml 对水 30 公斤或甲氰菊酯 1000 倍液喷雾防治。

**红蜘蛛：**采用哒螨灵、阿维菌素喷雾防治。

**棉叶蝉、烟粉虱：**采用啶虫脒、吡虫啉、吡蚜酮、菊酯类、印楝素等农药喷雾防治。

**棉蚜：**采用吡虫啉、啶虫脒系列农药喷雾防治。

**豆野螟、豆荚螟、瓜绢螟：**采用氯虫苯甲酰胺、甲维·茚虫威、甲维·虫螨腈、苏云金杆菌等防治。

**实蝇：**采取 0.1% 阿维菌素浓饵剂、诱蝇球、诱蝇黄板、实蝇诱捕器等措施进行防治。

**大豆病害：**于花结荚期进行防治。适时喷施唑醚·氟环唑、肟菌·戊唑醇、咪鲜胺等防治大豆锈病等真菌性叶部病害及茎枯病、炭疽病等茎荚部病害；喷施唑醚·烯酰吗啉、氟菌·霜霉威等防治霜霉病，喷施春雷·王铜、噻唑锌等防治细菌性斑点病；喷施腐霉·多菌灵、氟唑菌酰羟胺、异菌脲、菌核净等防治菌核病。

## **公益提示：**

- 1、融合推进统防统治和绿色防控，助力化学农药减量增效，促进农业绿色发展。
- 2、科学使用农药，注意农药使用安全间隔期。
- 3、严格实施植物检疫，守好农业生物灾害防控第一关。